

BIJLAGE

Overzicht van raseigenschappen bij zomertarwe. Gemiddelde resultaten over de jaren 2004 t/m 2009¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Lengte van het stro	Stevigheid van het stro	Vroegheid in de aar komen	Vroegrijpheid	Resistentie tegen:				Korrelopbrengst (relatief)			
						Schot	Bruine roest	Meeldauw ³⁾	Bladvlekkenziekte	Kleigrond		Zand- en dalgrond	
										Met ziektebestrijding	Zonder ziektebestrijding	Met ziektebestrijding	Zonder ziektebestrijding
A	Trappe	106	8	7	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	102	102	97	93
A	Tybalt	98	8	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	7	101	101	99	100
A	Zirrus	102	8	8	6,5	7,5	8	8	7,5	99	99	101	100
B	Baldus	95	8	8,5	8	8	7	6	6,5	86	82	95	92
B	Pasteur	103	7,5	7,5	6,5	7	9	8	7,5	86	86	89	99
B	Quattro	112	8	6,5	6,5	6	8,5	8	7	97	95	89	97
	100 = ...cm; ton/ha	91								8,4	7,9	8,1	7,4

- 1) Lengte van het stro en korrelopbrengsten zijn weergegeven in verhoudingsgetallen. Hoge waarderingscijfers betekenen goede stevigheid van het stro, vroeg in de aar komen, vroeg rijp en goede resistenties.
- 2) Rubricering op de Rassenlijst 2010: A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras.
- 3) Geen nieuwe waarnemingen in 2009

Het onderzoek is gecoördineerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR te Lelystad